折

肱

漫

錄

飲食但取益人好求爽口本草須常考訂好食 消之物俱兢兢慎之故能保此殘喘縱口腹佳品在列未嘗深頤油膩炙煩亦不敢食一 相妨之物于脾胃素弱平生不多食生冷瓜 **仏漫様へ終され** 録卷之五 古吳程永培瘦樵校 **檇李黄承吳履素撰** 一殘喘縱口腹之 樓之 切

則 亦不宜多食者至若南方麵更為助濕所宜 प्रा 乃大補益人之 **炙灼煎炒病家最忌** 方人以麵爲命 也 自惜其身不可謂智 47 / 17 - 1 ·腫麦才疾諸: 食麵方飽 一穀但本草言其擁 助火銷 症 平因於是 陰損人不淺 然少動品 即 風 氣

基嚴北 痰 能少飲益人甚多 也 與茶雜飲能致酒積子見人多雜 冰為命飲之自謂有益冰果茶酒 **炫漫錄**《卷之五 豚魚最發病攝養家尤不宜食 間損益霄壤 人禀厚與南人大不同常見北 遇飲至醉則傷人 飲獨子守 於暑 心導

郑應忌耳 一令予以牛乳下九藥原不言與酒同飲予不 每遇冬月常以然酒飲乳酪已四在南都有 **氣急呼洒飲之乳下喉未全到胃遇酒** 乳同酒飲此常事耳萨立齊云酒不可與乳 指 不傷南 人乳言耶然兩者同飲亦往往見之想 人寓北者罕見有此 同

法治之果一華取酥與消 背 坐高堂日以為常供則 秋不宜食洩氣 此乃乳滓質凝 後 西 後覺胸中熱氣填塞浸冷食之信可辟晃西瓜能辟暑生冷中不甚忌之殊不知暑之果一服即消物理相制之妙如此 與消導藥同飲當得去此碍膺之 詩元葢秋味辛辛乃秋 胸前而 有損脾胃秋來瘧 酥者 物遂

明目又絞汁熬稀膏蜜調 本 |加皮本草原言取皮用令人多摘其芽此未 耶採柔條作寸斷炒黃色煎止消渴本草著其功效如此 杷 味故忌之 晒乾蜜丸 葉作 鱼卷之五 茶 啜治消渴强 服 開 調 利竅 服能去火奏解金石 侌 通 湯可以代茶最 ÍIL 人 脉安 何 多取 魄 聰

解 陰氣 最清香令人皆飲然虚弱人止宜候渴 序云 宜熱 **止者** 大熱本草言多 所當痛戒 斯 釋滯消壅一日之 大此 冷 亦欲募清客之名勉 則聚 可謂嗜茶者之戒 、族多飲: 則少 肺走氣又能發 利 腫 强 飲啜 四 服 則 心導樓

蓮子 橙皮 泄清心治腰 食泉盆 少食 冷不可多食煮食則不冷然作 心否則恐成霍亂 冷惟煮食養神了時食此不報 生食微動氣乾食作問鮮蓮亦不宜 傷肝氣不宜與猪肉 が下 人同密食令人 痛 滙 上痢磨作飯令收體 腹臟肥不生諸 同食 和米 多食 健

**斤玄是圣》(474)** 瓦 能益腎然生食發氣等 酒消 眼肉本草言其意 **蕉共酒食發痰亦傷脾** 把能潤五臟然多食發熱生痰 同食不消成血瘕 與鯽魚同食成疳再與葵菜同食生 **他盆心脾功與人參並聞華** E. 心導樓

陸平泉宗伯年幾及百平日常食龍眼不輟口子 少年多食此果老來食之齒輒痛以是不能食但 石榴味酸性滞能戀膈成痰不宜食 醇酒飲易醉人且患心痛至死期間常設紅柿 常服龍眼膏 **北柿氣平不寒食之無害** 灰同酒飲此不可不知 月れるノインコ 不可與蟹同食此人所知也本草言紅柿忌與

虚與脾虚者忌食 樣子大有益宜食 行本曼康一段ここ 丹溪云館糖大發濕中之熱以其廿能滋濕濕 千令人少亡此東儘可不食 東多食動風作淡小見食之發驚本草言如食 性流利下行雖能消痰止嗽多啖令人寒中血 性雖熱亦有消食下酒之功 然動風痰助腎火 心導樓

大豆性本平炒食川熟作改則冷作腐則寒而動熟八食令人身軟發心悸又云多食令人多睡發型人皆言糯米補人考之本草云 上温中令人多 世人皆言糯米 助 不可食 草云床 油煎煉飾食與火無黑齒痛及脾疾

成溢飲之症總非住品其子更甚有推墙倒壁之氣虛者切不可食子常受其害煮食又多停膈間 斤公是茶一大工工 豆肉平而皮寒脾弱人亦不相宜花 豆雖發氣而能調樂衛 豆利水逐精久服虛 豆即俗名馬料豆最益 能 解 心導樓

其害能令頭汗津淖不止且動火不可輕 葱白通陽發散更勝於他藥氣虛人 す 月刊金門名に日 勿服子常受 用

胡蒜生敢傷所氣損目久食傷脾肺引痰養生者蜜糖食殺人此易犯者謹識之

子性冷多食損人白茄蒂與何首烏陰乾白

節慎之

**萊複代之此于所親試而效者** 經霜冬瓜皮同皮俏煎湯洗痔極效如無冬瓜白 矮瘟疫病後食之多死 華水平旦時未曾打動第一汲者與諧水異 廣補陰虛消頭目蓋天一真氣浮結水面而 公長後 長り元 養精益氣保血脈令人肥健皆食常 性冷而消不可多食不可與醋同噉令人骨

寒傷脾 名狀 露水清金降火子曾取以釀酒其鮮甘之味難 月孔至一分元 以造酒醋亦不 以熱酒點服味甚住有言其補益者有言其 一飲河水得土氣乃佳不宜久飲山泉氣 血妙品然滑腸脾弱人亦不宜多服 則益多川助疾理或然也 壤

猪两性熱助火生痰不宜多食小兒尤宜戒之猪肉性熱助火生痰不宜多食小兒尤宜戒之人肉助火與陽陰虚火動者不宜食其肉較豕頗 冤肉不可多食傷元氣絶血 脉損房事不可同薑 六人支微薰蒸力少難於消化不食為穩著 一發虛壅 補益之功至于黃芪同然性易凝結脾弱

橘食不可同白鷄肉食冤死合眼者勿食二月食 傷神 蒜及李子食不可合大肝腎食不可合芥菜蒸 內多食能動人相疾 錄、卷之五 **开达曼家**《经之后 耳等食自死爪不伸者食之殺人春夏不宜食 卵滞氣灰食即無妨 久食令人瘦發痼疾不可合胡桃蕎麥香 日勿食此禽益少損多食者愼之 頭鴨白眼者食之殺人忌與鱉肉同食 不可與木耳胡桃豆豉同食 和葱食短氣同驚食損 動濕疸病與水腫忌食俗云能動 心導

合芥子食發惡疾 三足者赤足者腹下有十字 鱉肉合烏雞食成複合雞子食殺人合莧食生 字五字形者頭足不縮者目凹陷者腹下紅有 多食蜆發嫩冷氣消腎 鸽肉能减藥力服藥人不可食 麻雀不可和李子食亦忌與醬食 補中益氣勿多食 月不宜食生蜜恐暴霍亂 月北金一年三二

赤獨強獨目或兩目 足四足者並有毒不可食中共毒者或蒜冬瓜 解 者及生旱地者俱有夢不可食中其 広見後へ、安を一丘 雖益人然多食亦令人目闇頭悶 宜食場百越 的腹下有毛腹中有丹 1 心導樓

**忌同猪肝雞肉食二三月忌食頭** 鲫魚雖益人然多食亦能動火总與猪肉同食 忌犯天門冬同芥菜食成水腫同沙糖食成疳 勿食鯉亦忌天門冬治鯉須去黑血及脊上兩 魚飾不可同豆蘿食 天行病後忌食煙又忌食鯉再犯即死有宿瘦 月毒誤中者浮洋可解鯉魚子不可同猪脾食鯉 但擔者忌食黑魚令人白搬 ラススラ

鱸魚不可與乳酪同食 青魚忌與葵灌萌荽同食亦忌者术 鰻鱺水行昻頭者有毒 鄰性大温多食令人霍亂亦動風氣 說飽過飽飲餛飩原汁即消食一 不宜多食發於助風又一種無鬚戰及煮色白 疳冽者不可食筋魚 下通黑者並有泰作 飾能奏人 切肉過飽

**一种新即愈市上索粉中多雜以小粉食此過傷者成灰存性服之即消有人食乾柿過多欲死食以成灰存性服之即消有人食乾柿過多欲死食以** ~煮肉一 食店中所储原汁亦可消濫店中所储之汁 (清司馬云吳中何公良俊之父年百歲 至理馬凡食某物過多停滯者即燒此 一滚即爛飲店家珍重此汁而藏之 以

無恙子因諦審之此花地瘦即單葉地肥即變千 寬高氏 尊生八股註章草花苗皆可作蔬食干 者心疑之子家園中有干菜花人多采食之絕 者食之殺人子向戒不食後見北路所種多千 性熱不可多食人食是未可解 子而已世俗多言糯米稍益人效之本草又言 服食調養之法何云别無他法 種高氏之言葢承訛非親試也 惟多辰食

折贴漫錄卷之五				

蓋火能軟堅化物燼從火化故也諸灰能消食亦五穀皆補養犀氣之物一煅成灰反能消食者何 傷即功用不減于山查神麵不可忽之以爲食 而多服常服也 **覆養形篇上** 古吳程永培複樵校 **檇李黃承昊履素撰** 八十十十十

一步之中,一步之中,一步、一方、</ 壓出血水多多許即愈不復作膿作 多卷之六 礼建村

粒初二加 品宜其得力還少丹與打老兒九相同噉如故平日服補中盜氣湯還少丹二州黃宗伯諱汝良者年九十餘猶然精 無窮用白湯生吞下不為宋人人大得益補 拡張能力をとい 粒以 有奇劾 漸 花識 一粒以後漸加至十 而減至次月朔又 服黑 〈服 粒起 五粒至十 心事心 二藥故

必得駿發子藻每從人求長眉之法 言有藥但服數 時眉絕少有風鑑相之云如此好眼若 同年朱司宠廣原 乃出庭除 服藥後 大憊自後服人參數 切須避風 及歸寢大汗 厘眉即生矣遂進末子 一子諱茂昭字子 服之 夕即 止 有 藥六 值 眉

以下出昨井齊日祭 取漫議 東 を と た 也如此 **莫可問也** 士壓不至 **外處立不** 而飲不 多言笑譬 或云此藥是間揚花未 遠行不疾步 至疲先寒而云 批勞不 欲起供不欲多 心導

百一下 也 冒之 <del>州景</del>經日 **欲極温夏不欲** ・イ・ニーパフ・ベーノ 飲酒當風不 五味不 多傷心甘 远令人一 而之 上 **低多酸多傷脾甚** 多傷腎此五行 多酸多 面有光 得兩 浴不 澤 皴 手摩之使 班 多傷 風

摩之使髮不白脉不浮 媽黃肉本草載甘温煮食治虛損調中治 備嘗海產無如 目叉順手 止渴炙食甚美令人細 續養形篇下 | 牌獨此補益且其味亦冠海錯子於 此味之 , 佳耳炙者罕見惟於泉州 佳但煮食腥氣 肌膚美顏色海 四 心道 闆

健嗜食本草中 **蟥匿其中難于 听即芹菜本草** 滑地食之 蟲子右葉間 見 餉乾 不 其味 **中健品也但生於水田中者名** 中健品也但生於水田中者名 中健品也但生於水田中者名 載甘平養 果 佳 脉光系令 永

瓜之性世俗 九 綱 相反之 なる芸術ではいして **於**京血 江時食之 此品入素就平平耳以之煮肉則味絕佳 脉 目则云廿平又哉 之甚也竊視 一解毒治疗 知此瓜應 不機又云明目益 一益產白廬山 相 傳 是甘京之氣味若目 海海下血等症又載其 五草 東北瓜縣熱利鹿 以爲至寒食之敗陽及考 生生細指爲媛胃助陽 诚 著 ī 其通 日助 心消 鵬

有用黑小豆蒸聯之語世傳黑小豆方藥功用甚 冬瓜俗傳為娱肚之物考之本草甘微寒大能散 縣確然甘涼啖之無損 黑小豆本草所不載止載大豆及綱目註何首鳥 縣在然甘涼啖之無損 脈 不知本草何 以此豆人鹽煮熟時常食之 以獨造惟食物本草載 黑

多以之 一下になるととと、 へんこと 無馬科豆養豆之名益即此豆是也此豆北方最 吳中少馬故此豆不來今大亂之後北馬在三 裁黑小豆即灌豆本經只言黑豆小者入薬 近無粒豆到三吳筧之苦不可得是不可 野要知此豆功川更勝大豆也又皇南本 武林者甚多而此豆然不至更不可解 以晚白米為上以其性凉益 | 喂馬故名馬料豆販此至者只至常 <del>-</del> 心等數

八七月收者為早粳止可充食八九月收者 者即可入藥南方氣熱梗性多温性一 人責于路五穀不分吾輩目思之吾亦不能分 京乃可入藥運凝晚類得金氣多改色白能 梁與栗义是何物岩諸本草各家之說紛然總 確然也稱黍稷麥敦為五穀見於朱莊矣其所 而解熱也早梗得土氣多但益川胃 月收者為晚複北方氣寒粳性多凉八九月 多が老スプ 十月晚

いる 見た 一人にこう 也寫見北人總呼為小米為黃米然稷 網目李時珍所訂無幾近

豆之總名亦人所易應惟詩經又有黍般稻粱之似而米粒較粮稻粗其種逈異一為黍一為稷斷之生也形似稻其子跡散分垂于苗端與大米相 又有云大而毛長者為梁和而毛短者為栗 周禮又有九穀六穀之名有梁無栗意栗郎 種而稍異者耳即今之 似蓝栗共子叢生直 海野、港之丁 立於宙端而米粒 是

呼爲小米膏粱間 栗甚罕普天 削 亦呼爲小米土 是梁即粟之 毋 下多食梗料 取以 未 一証然1 之名目古今称之便和二種今言! 佐食不以 聞呼蘆粟為小米 **邓**至于 為 正糧 Z 此 丽 即

類党非粟乃米穀之 采耶至于秫也者是糯米之别名陶淵明好 **烂標蜀黍為蘆菜**則聚又是黍類矣何以又 **蘆粟即小米寧不小視粟而大費唇舌耶且** 力古者大米 |雖有聚孟子米粟非 卷之六 九工彭澤人地宜大米 小水光之 )通稱乎若 稱論語再 不多農有 則林 好 又 諦 水 Ä 曰 村

食物本草所載酪穀訛亂尤甚亦可謂立穀不分載從未見有小米酒則陶之林斷是大米無疑也是矣又云栗之粘者為林豈其然乎子宦九江二 折肱漫錄卷之六

				<b>折胜漫翁《卷之六</b>
	-	,		九八三人

其於問氣闡發極精乃按之天時民病亦多不合 相同耶近者或林徐季孺刻有運氣商言之尤悉 于今而按之天時民病多不相合豈古今氣運不 五運六氣之競內經詳言之後賢疏註更詳但至 折肱漫錄卷之七 續醫薬篇 古吳程永培與樵校 **檇李黄** 承昊履素撰

お見事生人名又一 也是不可解竊謂治病者得是說而存之用藥時 原有拾時從症之訓則不可遠症以從時也明矣 過熱邁熱無犯熱之禁於寒亦然如相火司天而 熟無犯熟寒無犯寒之說則是夏不可用熱藥冬 經云必先歲氣無伐天和二語須認明白如先哲 爲照顧如相火司天叉兼行火運則用藥不可 鼓瑟而斤斤林守恐反多盜碳而致恨 即用熱亦無妨或行金土運亦似可不

**丌之氣夏宜** 降之至於夏浮冬沉非削必以辛熟苦寒浮 矣春宜順春升之氣 放漫级 卷之七 沉則順之寒熱温凉則逆之 日李時珍之言日春宜加辛温之藥以 用寒藥春不可助木秋不可助金矣及讀 說相背當何適從獨不 加辛熱之藥以順夏浮之氣秋冬 似升之 秋宜順秋降之 觀經又云乎 斯二言可為定

耶 河火王 例論乎經叉云春省酸 加寒之 於順之說亦築論用藥之理宜 温則凉之涼則温之 可泥也升之不已為浮浮之 例論也 土土虧放欲抑木以為 增甘以 所謂逆之者 心也量 助 然又 英升 省 寒

飲若內外 煩勞 精氣 獎铁一 是然冬至 不已 端可類推矣故問夏月伏陰在內不宜 過冷或過 一灰也 爲沉沉之義何居 銷之乎則夏令宜辛熟之藥其說 《卷之 陰生正宜保護微陰其可 心核謂 服然藥使汗不泄 七 ベ月 多溲或服 陽賴于客不宜 如陽氣潛藏 升散之藥使 陽豈可 必 止疾 ıΫ 飲 氣 氣 服 服 導

戎寅之冬武塘錢仲馭進士忠肺 教服 則無伐天和之奥義可明矣 沈 濒危又一 某僧房慣貯之 陳年醃芥菜 聖思言共母氏當年會思斯症亦 傷之乎則尽令宜苦寒之 僕 图 步 亦然 服 輒効甚以 旗有 總 論連氣 為奇

· 邊為辛寒辛寒能散痰热芥菜三通肺氣所以者飲數匙立効其義以芥辛温得鹽水久窨之 年乃用之愈 本草經疏中無腥草下又註單用搗汁入年 經 癰 記念を一名ニハーニ 飲之 有神効也然不須百年客數年 亦載 治肺癰有神然可不須 此 人愈妙但飲一 方則云用百年芥菜滷 駳 13 即 人窨

余辛巳 如 効壬 月記金一名える 線 飲 淋 秋自 且能遠 矣 及問 遯 小 (余等患) 便 淋漉幾成中滿之候矣亟服 训 金 射 置腎 病乃 净 此服八味地黃九更 泉叉代 閩海 刷 散 患脾泄乍止 如珠至 **胂**泄 署與泉道築陪 不止 [ 一飲食 紫河 迹 直 則

子乃覓首生紫河車 而更劇諸症俱至此時 複鉄へをして 月至後度梅嶺時氽牌健體住甚樂也 知河車功力信不可誣 命自閩調與東泉長以重陽後十日行 朔服至八月病乃 具加于八 則八味九等藥 一胛胃 五 味丸內服之 蹇至冬而 心導

刻矣西刻抵江口将祭江以腹饑復飲 余喚數聲始應又復昏去不醒舉家態該 忽覺虛汗發額頭之又覺頭母勉强了 此時余患痞疥者 也急煎獨參湯次兒喚余復醒兒問 |舟則漸入昏沉去矣時次兒子錫隨任急過 偶以此花五六錢煎湯半厩攙酒飲之時 一得已强飲之是月終旬舟望江 年矣不服别藥惟飲 祭江 瓶酒 金

見問余應用何藥余口授次兒筆之余日此必蘇 服否余首肯服之停敷刻吐痰半杯少 復昏沉矣小睡而醒以手捫身捫 香敬氣使然 |薬也復以花 是可畏次日食 日方午余體漸健開窓看山因啖飯先飲酒可畏次日食粥服藥調理稍安越二日舟望 爾時只謂受香酒之累且以金 FL 八酒飲之 服獨參湯因就寢則心已明 飯甫畢而 。銀花爲治 頭暈復發 一處麻一 一覧清 心導 處

暈蛇 邚 乃從樟樹鎮肆中市 向 至害人爾 如是而慢咎蘇 晚之 乃益信此花之毒不然 鳳鳴者以手背生毒亦煎此花酒 食豈無見乎幸不 (候翌) 任後不復患此症 爾信乎藥物不可 日 而蘇 合則冤矣蓋 來之物 始疑金銀花之 數 服 知候薬之 不知 即 此 雜 即平 取何立 候尼父沽 花 非 何毒草 服 祟 臘 所 坐 瓤

何狀矣中毒 一人矣慎之 時次見不侍家人延庸醫惧進他藥又不 原之病矣於此見宦游不可不 人腿足酸疼軟弱等症大半是足三 水落者好以手搔 矣與之腿足酸疼 即女人搽而之物 漫銀 卷二七 爬血肉淋漓 最能解毒子次子痘後 一促共壽子親見有 心導

等俱妙海窜 们思之子亦患際**口痢甚危**轉 **炙存性為末黑糖 僕即傅** 滞下 方與之用大 調薑湯下 八艘魚骨一 服之 旋旋 園丁育 條併 也後以 愈適友 方服之亦 頭 新

治目之藥世醫多三滋陰降火而先代名醫皆三 七分半甘菊白芍藥各一錢枸杞二錢炙甘草黃 、陽補氣雖互有得失而古人之說爲長況尊 広曼家ではプピ 見細字絕無昏花但不耐久此其不足不在陰 如左其方蜜炙黄芪人参各二錢升麻柴胡各 而在陽氣明矣正且服益氣聰明湯今畧為更 各五分煎空心服再煎食遠服三煎臨臥服 一滋陰之藥就於于王宇泰先生遺子手扎二 心道。

**矛齒** 分 當 歸 來驗之畢竟養血無効而升氣得力 服清胃散半劑 目疾 刻證治類方載此方升麻用 分兩太不勻薛方 方黃連 生地黃連各三分而醉立齊所刻內科 用 回 即愈藥如中病効 [頰係足陽明胃 錢六分升麻一 が先生 錢其餘各 錢牡丹 同如 經風熱子 刻方皆 一誠有卓 此王 先

一西歲六月間予避亂 難爲苦治之半月無効讀玉機改義有怖乾燒 験甚詳因覓此藥服之不及一 月而愈然痢雖愈而血未止兼以大便燥即患血痢予年老不敢服下藥但調之而 氣散碎本少百术等四味更覺清楚協病 服一方考之本草綱目亦載此 小船奔走冒暑而不覺處 他本分兩多有不同 兩即愈 心導

之又讀丹溪論云凡邪深入于臟者必提出於腑 前者屬陽易愈發于午後子前者屬陰難愈子 是歲小雪前在山中又患瘧間日而發子不患 氣時行使然初次發于黃昏方書云發丁子後 病者五十餘年矣未有大威冐而得此想山 便加 汗可解予因多服升提之藥而不甚

於發表改尅致傷脾胃反致綿延不已 陳月坡宗先生之法以之治熩頗効葢仲景 **広見条プルバー** 千餘年氣運大變治病亦須因時制宜若 所用之藥大都是補中益氣湯而極論不宜 仲景諸方云若不應分六經表裏而治之說 然觀薛先生所治諸人之案並未見用各方 一齋治瘧極言補中益氣湯之妙醫案內雖 五次升至寅時即愈 〕近世名

以治今病是猶以 府者甚久<br />
乙酉仲夏移歸湖州郊外<br />
逢大亂遊 **馮數次危殆已甚開降家葱煎豆腐甚香思食** 覺快口食後小便即通於是連日食之小 **%腹大如鼓頭靣手足俱腫小便不通大便** ,靜公又字不二長興人寓嘉興予家延爲 \治繩而治今之世也其可乎

爲憂殆將不起月餘丁再至山 広曼家へだとし 遂可步履謁容予初在 消以後服者俱効 切腫毒傳來 服此方無不內消余次子臂漫 一告予得生之 療開所未開特為記之 方甚効験凡 で 枚 丁亥在山中有管庄 如此夫 漫 臃腫 中則面 腫 脹 一劇疾也 腫作 腫已平 心導樓 痛

すまたい イントラ 服之 即平復真可謂神方矣方用生黃芪 錢金銀花五錢黃柏三錢水酒 連進三 |肌散之 最速並無他害子家人 每言生 叉 害人 服 兩麻 オ 加皂角刺腫毒 肌收口之藥不宜 小便出濁物升許竟爾消 、而言毒盡時但 四 歴試之 用當歸齊 頗驗原

服 本草言防風能潟 **开数夏楽/ ピャー** 夫既稱瀉肺實則其性 云治盗汗以防風 丁試之膏太軟 又云自任 矛盾 地入 耶子曾冒風而病以體素弱用 肺實 止以防風 爛不便貼或當增藥減油 服之頓覺疎散欲汗 候 一兩芎藭二兩人參半 服海上 發散矣而又欲 一錢用浮麥湯調 上焦元氣及後 服

安平無事 多喘 倦 す月、子母||名 ス 俟 自謂宜 敷不能服醫者以清火降痰治之愈甚<u>幾</u>危 多术與防風同用尚不禁其**疎散**若 汗是愈洲其汗矣誰敢嘗試乎傷 泛用样侯年四旬患痰火上 則須多不可少更宜加 乃放膽連 服 参告諸醫者請以數分試之醫 服數劑竟愈引 桂遂治藥 火歸源先 一香吐痰 服前 風 服

(與其口即黑者是最能鳥類子表兄小哉父太 有人傳與一方单用此草搗汁熬膏蜜收貯之 太漫除一なと七 目以酒服之久服鬚髮不白 外鬚果不白但皮肉亦漸黑且不利 **川不服鳥**鬚 體陽俗名京筒以際促 腫毒則未之患也歲在戊子 圭 下戬父守 心導構行

隔蒜炙子遵之惟謹畢竟得力不至詹大難收 艾壯宜小而數宜少多不得過三七出也子文 **不惟頭項不宜多而立齊則云亦宜矣之** 在外科樞要精要二書知毒之初起最要是右背連忠二毒受界凡四閥月子久關薛立 有益而無害益信立齊之言不誣蒜以獨 有三矣其冬暮頭之右偏忽患 一分厚者有言二文發厚去

散子遵之幸不受藥物之旨此議論識見實超 以予試之三分太厚条火全不覺恐是, 但老弱之人不能堪此立齊以托裏敗毒散易之 俟潰後即去連翹白芷金銀花而竟服托裏八味 (夷者古人之書頗論圍藥敷 力凡患毒者多服十三方仙方活命飲以敗 一者也今忠毒者峭翳輒以閩藥膏藥等 ·同耶是在智者審之 藥膏藥之害豈古 腫毒 Ī 心尊變

他處矣廣掺皆然頗爲可懼時有請仙者甚靈子 **命兒輩派之仙云無妨疏** 一三次水不復來遂爾獲愈亦神矣哉清水謂之 粉血竭五色花龍骨若白者不効各等分為 出不絕時醫以於藥膏藥治之少頃藥皆浮移 石戶思毒以年老潰後不多得厚膿時有清 多出亦無妨不可早山之止之太早將復 ・ 金之一 **掺水即緩而少薬即成痂濕處補** 一方見示用珍珠人念

折広漫録巻之七終		<b>連寿</b>
去		
心導樓		

•

				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				1
	·			

戒 则 原 養形篇 自 投 爲醫家立說 一藥品十 八府者 峻 爲醫誤 則 肱漫 也 可粗. 曾收入杏 幼 質弱之 錄 **%一書** 則 忽 其意是惕 也 調 理 或存中 则 心導 痾 油

功亦不淺矣但養 則病情不致於固生 其說 隆 頗 一雜莫如案 九年二 頭置鶴林一 一月古吳瘦樵 神篇 野林玉露等書更勝突故縣所採皆子史傍及釋道樂不致於輕試則此書之 程永培跋于紫